

## **Relevamiento de dispensación de Anticoncepción Hormonal de Emergencia versus Preservativos y la educación sexual adquirida por los pacientes en Farmacias Oficinales de Posadas.**

**Autores:** Farmacéuticas: Flores, Mariela; Ilchuk, Vania; Rivas, Romina; Ostrowki, Marisa.

**Lugar:** Oficina de Farmacia (Farmacias: Mercantil, 20 de Junio, Romana).

### **Fundamentación**

Desde que las mujeres se inician en la sexualidad, su principal preocupación se basa en evitar el embarazo no planificado, dejando en segundo plano su atención, en el riesgo e implicancias que puede tener en su salud en general y reproductiva, el contraer enfermedades de transmisión sexual (ETS).

### **Objetivo General**

- Comparar las ventas del anticonceptivo hormonal de emergencia (AHE) y preservativos, de Septiembre a Noviembre de 2015, e igual periodo en el 2016, en tres farmacias de la ciudad de Posadas.
- Detectar abusos y mal uso del AHE y relevar conocimientos sobre AHE y ETS en mujeres en edad reproductiva.

### **Materiales y Métodos**

Se realizó un estudio de tipo descriptivo transversal, respecto de las ventas de AHE y preservativos (cajas por tres unidades), entre los meses de septiembre a noviembre del 2015 y el mismo periodo del año 2016, en tres farmacias, localizadas en el microcentro y periferia de la ciudad de Posadas. Se encuestaron a mujeres en edad reproductiva, entre los 15 a 44 años, respecto a la AHE, métodos anticonceptivos y conocimiento de las ETS.

### **Resultados**

En el 2015 se vendieron 119 cajas AHE y 129 cajas preservativos. En el 2016 se vendieron 140 cajas AHE y 115 cajas preservativos. En el 2016, se visualizó un incremento del 15,00 % (21 cajas) de las ventas de AHE respecto del año 2015 y una disminución del 12,00 % (14 cajas) en las ventas de preservativos. La cantidad total de pacientes dispensados en 2015 fue 7.250 y en el 2016 fue de 6680.

Del total de 160 entrevistas, un 75,00 % (120 mujeres) manifestó utilizar alguna vez la AHE. Un 61,66 % (74 mujeres) la utilizó más de dos veces al año y un 38,33 % (46 mujeres) la usó más de dos veces al mes. Un 100,00 % (160 mujeres) expresó tener conocimiento sobre las ETS. El 30,00 % (48 mujeres) utiliza el preservativo como método de anticoncepción. El 45,00 % (72 mujeres) utiliza otro método anticonceptivo y un 25,00 % (40 mujeres) utiliza algún método en forma intermitente.

### **Conclusiones**

Se deduce, que decayó la venta de preservativos, al tiempo que se elevó el consumo de la AHE. Se considera preocupante el incremento del uso del AHE, su utilización como método anticonceptivo habitual y el uso del preservativo como forma exclusiva para evitar embarazos, sin considerar la protección a las enfermedades de transmisión sexual.

Creemos encontrarnos, ante un problema educativo sexual, y que se debería poner mayor énfasis en la promoción de los métodos anticonceptivos, en la correcta utilización de la AHE y concientizar sobre el uso del preservativo y ETS.