

# **ACCIONES IMPLEMENTADAS A PARTIR DE UNA ALERTA DE FARMACOVIGILANCIA SOBRE EL USO DE ANTIDEPRESIVOS Y RIESGO DE GLAUCOMA DE ÁNGULO ESTRECHO**

**Sen, V.; Amherdt, A.; Asinari, M.; Boscovich, J.; González, A.; Grigolato, V.; Pagani, M.**

Colegio de Farmacéuticos de la Prov. de Santa Fe -1°C.

virginiasen@yahoo.com.ar

## **INTRODUCCIÓN**

El glaucoma de ángulo estrecho (GAE) es un problema ocular agudo que puede provocar ceguera. Algunos medicamentos al producir midriasis podrían desencadenarlo, entre ellos, los antidepresivos, ampliamente utilizados.

Mediante una alerta de Farmacovigilancia (12/08/2016), la agencia reguladora canadiense requirió a los laboratorios productores de antidepresivos del país, incluyan en sus prospectos una advertencia acerca del GAE.

Es conveniente que los prospectos de antidepresivos comercializados en Argentina también adviertan sobre el riesgo de GAE y que el farmacéutico colabore en la difusión y prevención de este problema.

## **OBJETIVO**

Describir acciones implementadas por farmacéuticos para la prevención del GAE asociado al uso de antidepresivos.

## **MATERIAL Y MÉTODOS**

Estudio descriptivo-transversal, realizado por farmacéuticos de la Comisión-DAP (Colegio de Farmacéuticos Santa Fe-1°C).

A partir de la alerta "Antidepresivos. Riesgo de GAE" (HealthCanada), se revisaron todos los prospectos de estos medicamentos comercializados en Argentina, disponibles en el Vademécum Nacional de Medicamentos (ANMAT). Se accedió por nombre genérico. Se buscaron las palabras midriasis/glaucoma en "reacciones adversas", y GAE en "advertencias"/"precauciones". Se confeccionó una tabla incluyendo: Ingrediente Farmacéutico Activo (IFA), laboratorio, nombre comercial y presencia/ausencia de la información buscada.

Se organizó una capacitación para farmacéuticos sobre GAE y medicamentos desencadenantes, se evaluó conocimientos con un test pre y post-capacitación.

Se elaboró material informativo sobre GAE para los farmacéuticos y recomendaciones para los pacientes que consumen antidepresivos.

Se difundió la alerta entre otros profesionales de la salud.

## **RESULTADOS**

Se revisaron 118 prospectos de especialidades medicinales correspondientes a 17 IFAs: 27 prospectos no contaban con la información buscada; 48 la poseían parcialmente y 43 tenían la información completa. Dada la información obtenida, se envió nota a ANMAT.

En la capacitación participaron 36 farmacéuticos. Respondieron los test 24 participantes; de ellos, 15 señalaron correctamente que los antidepresivos pueden desencadenar GAE en el test-precapacitación, 24 en el test-postcapacitación.

Se envió información a 828 farmacéuticos y material impreso para los pacientes a 677 farmacias (comunitarias/hospitalarias).

Se remitió la alerta a: Colegio de Médicos, Asociación de Oftalmólogos y Asociación de Psiquiatras de Santa Fe, para la divulgación entre sus integrantes.

### **CONCLUSIONES**

Las acciones realizadas por la Comisión-DAP permitieron:

- difundir conocimientos entre los farmacéuticos para intervenir en la prevención del GAE asociado a antidepresivos.

- divulgar la alerta en el equipo de salud, en pos de la seguridad del paciente.

- comunicar a ANMAT, el déficit de información sobre GAE en la mayoría de los prospectos de antidepresivos para colaborar con su rol regulatorio.