



Identificación de los peligros y errores originados por medicamentos ISMP -Instituto para el Uso Seguro de Medicamentos –

A comienzos de este año el ISMP (Instituto para el Uso Seguro de Medicamentos), reflexionando, en el marco del 20º Aniversario del informe del Instituto de Medicina “To Err in Human”, presentó un valioso trabajo de investigación donde relevó el “Top 10” de los errores de medicación más graves reportados durante el año 2019 en EE.UU.

Lo enriquecedor de este informe es que la lista que se ha confeccionado no incluye, exclusivamente, los problemas informados con mayor frecuencia o aquellos que han causado las consecuencias más graves para los pacientes, sino que, a través de un análisis diferencial expone aquellos errores y peligros que han sido persistentes y que podrían evitarse, o minimizarse, con cambios en el sistema, en los procesos o en la práctica diaria.

La presentación de estos casos por parte del ISMP, nos permite tomar conciencia de que, **con acciones diarias**, podemos **liderar un espacio como profesionales farmacéuticos**, donde tenemos en nuestras manos la **posibilidad de mitigar estos riesgos trabajando** en conjunto **como miembros del equipo de salud interdisciplinario**.



Errores de Medicación más graves ISMP 2019 en EEUU

- | | |
|---|---|
| <p>1 Selección de un medicamento equivocado al introducir sólo las primeras letras del nombre</p> <p>2 Administración diaria de metotrexato oral en lugar de semanal en indicaciones no oncológicas</p> <p>3 Errores asociados a medicamentos con apariencia similar</p> <p>4 Errores de comunicación con prescripciones verbales o telefónicas</p> <p>5 Retirada de medicamentos sistemas automatizados de dispensación sin validación farmacéutica</p> | <p>6 Prácticas inseguras asociadas con la administración de bolos IV en adultos</p> <p>7 Errores de vía equivocada (epidural) de ácido tranexámico</p> <p>8 Etiquetado incorrecto de jeringas e infusiones preparadas por farmacias tipo 503 b que elaboran fórmulas</p> <p>9 Uso de jeringas para administrar alcaloides de la vinca</p> <p>10 Sobredosis de zinc (dosis 1.000 veces mayores)</p> |
|---|---|

Desde el **Dpto. Hospitalarios FEFARA** nos encontramos **trabajando arduamente**, junto a **instituciones reconocidas a nivel nacional**, a fin de **generar estrategias basadas en el uso seguro de medicamentos**, de las cuales **formarán parte los farmacéuticos hospitalarios interesados en participar de las mismas**.

Más información, ampliando lo citado en el boletín, en:

<https://www.ismp.org/resources/start-new-year-right-preventing-these-top-10-medication-errors-and-hazards>

¡Farmacéuticos Activos por la Seguridad del Paciente!

Entre todos podemos generar acciones para mitigar riesgos y asegurar el bienestar de nuestros pacientes, de nuestras instituciones y de todos los profesionales de la salud.