

CITOSTÁTICOS CA MAMA- TEMPERATURA AMBIENTE

Nombre genérico	Presentación	Conservación en envase original	Vias de administración	RECONSTITUCIÓN						DILUCIÓN					
				Diluyente	Volumen	Tiempo admin.	Concent. final	Estabilidad		Vehic. p/ infusión	Vol. Infus. (ml)	Tiempo admin.	CC recom/ CC max	Estabilidad	
								25° C	2-8°C					25° C	2-8°C
DOXORRUBICINA	50mg	15 -25 ° C	Infusión IV	SF 0.9 %	25 ml	N/A	2mg/ml	7 dias	15 dias	SF 0.9%	NE	Mayor a 5 min	NE	NE	NE
ETOPOSIDO	100 mg/5ml F.A	TA <25°C	Infusión IV	N/A	N/A	N/A	20 mg/ml	NE	NE	SF 0.9%-DX 5%	250 ml-500 ml	Lenta en 30-60 MIN	*0.2-0.4 mg/ml	24 hs	NE
GEMCITABINA	1000 mg	15-25 ^a C	Infusión IV	SF 0.9 %	25 ml	N/A	**38 mg/ml	24hs	*cristalización	SF 0.9%	NE	30 min	0.1-25 mg/ml	27 dias	NE
		15-30° C													
METOTREXATO	50mg/500mg/1000mg	15-30° C	Infusión IV- Intratecal	SF 0.9 % / DX 5%. preferible sf en altas dosis	50mg: 2ml 500mg-1000mg: 20ml	N/A	25mg/ml	72 hs	7 dias	SF 0,9%	100-1000 ml	EV push lento, bolo corto o 24-48hs infusion. IM, IT o SC.		48 hs	24 hs