

CITOSTATICOS CA PRÓSTATA

Nombre genérico	Presentación	Conservación en envase original	Vias de administración	RECONSTITUCIÓN						DILUCIÓN					
				Diluyente	Volumen	Tiempo admin.	Concent. final	Estabilidad		Vehic. p/ infusión	Vol. Infus. (ml)	Tiempo admin.	CC recom/ CC max	Estabilidad	
								25° C	2-8°C					25° C	2-8°C
DOCETAXEL	80 mg/ 4ml 20mg/ 0.5ml	2-8 ° C	Infusion IV	API + etanol	6 ml 1.5ml	N/A	10 mg/ml	8 hs	8 hs	SF 0.9%- DX 5%	250ml	1 hora	0.3-0.9 mg/ml	*6 horas	48 hs en envases NO PVC
	80 mg/2ml	2-8 ° C	Infusion IV	API + etanol	6 ml	N/A	10 mg/ml	8 hs*	8 hs	SF 0.9%- DX 5%	NE	1 hora	0.3-0.9 mg/ml	*4hs	4 hs
	80 mg/2ml	2-8 ° C	Infusion IV	API + etanol	6 ml	N/A	10 mg/ml	8 hs	8 hs	SF 0.9%- DX 5%	NE	1 hora	0.3-0.9 mg/ml	*4 hs	*4hs
	80mg/2ml	2-8 ° C	Infusion IV	API + etanol	6 ml	N/A	10 mg/ml	NE	8 hs	SF 0.9%- DX 5%	250 ml	1 hora	0.3-0.9 mg/ml		
	80mg/2ml	2-8 ° C	Infusion IV	API + etanol	6 ml	N/A	10 mg/ml	8 hs	NE	SF 0.9%- DX 5%	250 ml	1 hora	0.3-0.9 mg/ml	*1 hora	sin estabilidad
CABAZITAXEL	60 mg	2-8 ° C	Infusion IV	API + etanol	1,5 ml	N/A	10 mg/ml	30 min	30 min	SF 0.9%- DX 5%	250 ml	1 hora	0,1-0,26 mg/ml	8 hs	24 hs
MITOXANTRONA	20 mg	15-20 ° C	Infusion IV	X	X	X	2 mg/ml	7 dias	7 dias	SF 0.9%- DX 5%- API	50-100 ml	15 min	0.02-0.5 mg/ml	48 hs	7 dias